

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «ВАРИКОЗА НЕТ»

Гулимова А. И.

«01» сентября 2026 г.

ИНФОРМАЦИЯ

О ПРАВИЛАХ И УСЛОВИЯХ ЭФФЕКТИВНОГО И БЕЗОПАСНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ГАРАНТИЙНЫХ СРОКАХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, А ТАКЖЕ НЕОБХОДИМЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ИСТЕЧЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ, ЕСЛИ ПРИ ИСТЕЧЕНИИ СРОКОВ ВОЗНИКАЕТ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ И ИМУЩЕСТВА, ИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ СТАНОВЯТСЯ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

Номер	Результат оказания медицинских услуг, выполнения работ	Правила, условия сохранения эффективного и безопасного результата лечения	Гарантийный срок на достигнутый лечебный результат	Необходимые действия по истечению гарантийного срока результата лечения	Возможные последствия бездействия при истечении гарантийного срока результата лечения
1	Микропенная склеротерапия, микросклеротерапия	исключение солнечного загара, посещения соляриев, саун и бань в течение 3 месяцев после последней процедуры, ограничение подъема тяжестей до 10 кг, ношение компрессионного белья.	6 месяцев	повторная процедура при наличии показаний	увеличение количества ТАЭ, внутрикожных ретикулярных вен
2	Стволовая склеротерапия	исключение солнечного загара, посещения соляриев, саун и бань в течение 3 месяцев после последней процедуры, ограничение подъема тяжестей до 10 кг, ношение	6 месяцев	повторная процедура при наличии показаний	появление новых варикозно расширенных вен, увеличение их количества и размеров, нарастание

		компрессионного белья, прием флеботоников			явлений хронической венозной недостаточности: тяжести ног в вечернее время и после рабочего дня, отеки в вечернее время, кожный зуд, изменение цвета кожных покровов, примечание 1*
3.	ЭВЛК	исключение солнечного загара, посещения соляриев, саун и бань в течение 3 месяцев после процедуры, ограничение подъема тяжестей до 10 кг, ношение компрессионного белья, прием флеботоников. Соблюдение лечебно-охранительного режима в послеоперационном периоде	12 месяцев	повторная процедура при наличии показаний	появление новых варикозно расширенных вен, увеличение их количества и размеров, нарастание явлений хронической венозной недостаточности: тяжести ног в вечернее время и после рабочего дня, отеки в вечернее время, кожный зуд, изменение цвета кожных покровов, примечание 2*
4	«Тотал» - ЭВЛК	Исключение посещения соляриев, саун и бань в течение 3 месяцев после процедуры, ограничение подъема тяжестей до 10 кг, ношение компрессионного белья, прием	12 месяцев	повторная процедура при наличии показаний	появление новых варикозно расширенных вен, увеличение их количества и размеров, нарастание явлений

		флеботоников. Соблюдение лечебно-охранительного режима в послеоперационном периоде			хронической венозной недостаточности: тяжести ног в вечернее время и после рабочего дня, отеки в вечернее время, кожный зуд, изменение цвета кожных покровов, примечание 2*
5	Минифлебэктомия	Исключение посещения соляриев, саун и бань в течение 3 месяцев после процедуры, ограничение подъема тяжестей до 10 кг, ношение компрессионного белья, прием флеботоников. Соблюдение лечебно-охранительного режима в послеоперационном периоде	12 месяцев	повторная процедура при наличии показаний	появление новых варикозно расширенных вен, увеличение их количества и размеров, нарастание явлений хронической венозной недостаточности: тяжести ног в вечернее время и после рабочего дня, отеки в вечернее время, кожный зуд, изменение цвета кожных покровов, примечание 2*

Примечание 1*

- гиперпигментация и вторичные телеангиоэктазии;
- неврологические нарушения: мигренеподобные боли, нарушения зрения, речи, транзиторные ишемические атаки и нарушения мозгового кровообращения;
- флебит подкожных вен, развитие временной гиперпигментации и снижение кожной чувствительности в области медицинского вмешательства;

- симптоматический тромбоз глубоких вен и лёгочная эмболия с вероятным развитием летального исхода.

Примечание 2*

- Образование временного болезненного инфильтрата по ходу коагулированной вены, подкожные инфильтраты в области инъекций;
- Воспаление подкожных вен, лимфоррея и лимфоцеле;
- Внутрикожные кровоизлияния, гематомы;
- Тромбофлебит поверхностных и глубоких вен;
- Развитие временной гиперпигментации и снижение кожной чувствительности в области медицинского вмешательства;
- Развитие венозного тромбоэмболизма,
- летального исхода.